

เตือนการระบาดของศัตรูพืช

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรคแอนแทรกโนส หรือโรคกุ้งแห้ง (เชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides*, *Colletotrichum capsici*)



ข้อสังเกตอาการและลักษณะที่พบ

โรคนี้นักพบบนผลพริกที่เริ่มสุก หรือก่อนทผลพริกจะเปลี่ยนสี อาการเริ่มแรกเป็นจุดหรือแผลข้ำยุบตัวเล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่ ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม มีสีน้ำตาลหรือดำ บริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นจุดสีดำขนาดเล็ก เรียงเป็นวงซ้อนกัน ในสภาพที่ อากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลเน่า และร่วงก่อนเก็บเกี่ยว หากเกิดกับ ผลอ่อนจะทำให้ผลโค้งงอบิดเบี้ยว ลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง

แนวทางป้องกันและแก้ไข

๑. เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้า จาก แหล่งที่ปราศจากโรค หรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์ เอง ต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรค
๒. ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำ ๕๐ องศา เซลเซียส นาน ๒๐-๓๐ นาทีก่อนเพาะ
๓. จัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ปลูก ชิดกันเกินไป และกำจัดวัชพืชในแปลง ปลูก เพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นสูง ซึ่ง เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค
๔. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อ พบผลพริกเป็นโรค เก็บนำไปเผาทำลาย นอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
๕. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น อะซอกซอลโตรบิน ๒.๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ โพรคลอราซ ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐-๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๗-๑๐ วัน
๖. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่นๆ หมุนเวียน เพื่อตัดวงจร ของโรค

นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์วัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : รายงาน
 e - mail : wangnoi_๑๑@hotmail.com โทร. ๐๓๕-๒๗๑๐๖๖
 จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย