

เตือนการระบาดของศัตรูพืช

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนอนเจาะดอกมะลิ



สภาพแวดล้อมที่พบเจอ

อากาศร้อนอบอ้าว ท้องฟ้ามีดครึ้มสลบกับมีแสงแดดจัดบางช่วงของวัน และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ข้อสังเกตลักษณะและอาการที่อาจพบ

หนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในดอก ทำให้ดอกเป็นรอยชำรุด เปลี่ยนเป็นสีม่วง เทียวแห้ง และร่วงหล่น

แนวทางในการป้องกัน/แก้ไข

เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส ๔๐% อีซี อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หากพบการระบาดทำการพ่นสารทุก ๔ วันครั้ง และไม่ควรถรมสารฆ่าแมลงชนิดเดียวกันติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดนั้น ในแหล่งที่มีการต้านทานให้ใช้อัตราสูง



นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์วัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : รายงาน

e - mail : wangnoi_๑๑@hotmail.com โทร. ๐๓๕-๒๗๑๐๖๖

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา